PolySports™
SGN 240

28 + 3 +10
(28 + 1.3 + 8.3)

96% NS-54™

USA/INT
28 + 3 + 10

28.0% Total Nitrogen (N)
1.17% Ammoniacal Nitrogen
26.83% Urea Nitrogen*

3.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

10.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

5.89% Total Sulfur (S) from sulfur

*26.83% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC
EC FERTILISER
NK FERTILISER
28 + 0 + 10

28.0% Total Nitrogen (N)
1.2% Ammoniacal nitrogen (N)
26.8% Ureic nitrogen (N)

10.0% Potassium oxide (K_2O) water soluble

14.7% Sulphur trioxide (SO_3) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application Rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC
EC FERTILISER
NK FERTILISER
28 + 0 + 8.3

28.0% Total nitrogen (N)
1.2% Ammoniacal nitrogen (N)
26.8% Ureic nitrogen (N)

8.3% Potassium (K) water soluble

5.9% Sulfur (S) water soluble

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.
Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate
Throsk, Stirling
Scotland FK7 7NP

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC
ENGRAIS EC
ENGRAIS NK
28 + 0 + 10

28,0% Azote totale (N)
1,2% Azote ammoniacal (N)
26,8% Azote uréique (N)

10,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

14,7% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.
25 Rue de la Chapelle
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

Taux d'application : 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

Deutschland/Österreich
EG-DÜNGEMITTEL
NK-Dünger, 28-10 - Mischdünger

28,0 % N Gesamtstickstoff
1,1 % N Ammoniumstickstoff
26,8 % N Carbamidstickstoff

10,0 % K_2O wasserlösliches Kaliumoxid

5,9% S wasserlösliches Schwefel

Nettogewicht: 20 kg

Hersteller:
Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn

92 % des Gesamtstickstoffes sind umhüllt

Aufwandmenge: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Anwendungsempfehlung: Während der Hauptvegetationszeit mit 15-25 g/m² auf Fairways oder Sportrasenflächen ausbringen. Anschließend kurz mit 5-6 mm abregnen. Um die Verteilung in der Rasennarbe zu optimieren nach der Düngung gleichmäßig bewässern. Bei Temperaturen über 25°C mit geringer Aufwandmenge arbeiten und anschließend sofort beregnen. Sauber und trocken lagern. Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen.

España/CE
FERTILIZANTE EC
FERTILIZANTE NK
28 + 0 + 10

28,0% Nitrógeno total (N)
1,2% Nitrógeno amoniacal (N)
26,8% Nitrógeno ureico (N)

10,0% Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua

14,7% Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua

Bajo en cloruro. Sólo debe utilizarse cuando hay una necesidad reconocida. No exceder las dosis adecuadas.

Importado en España por :

Dosis de aplicación: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Instrucciones de uso: aplique 15-25 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 5 a 6 mm de irrigación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25ºC y riegue inmediatamente después de la aplicación. Aplique dosis más bajas si las temperaturas superan los 25ºC. No use en áreas putting de golf. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.

Italia
FERTILIZZANTE EC
FERTILIZZANTE NK
28 + 0 + 10

28,0% Totale azoto (N)
1,2% Azoto ammoniacale (N)
26,8% Azoto ureico (N)

10,0% di ossido di potassio (K_2O), solubile in acqua

14,7% di triossido di zolfo (SO_3), solubile in acqua

Basso livello di cloruro. Da usare solo quando vi è un bisogno riconosciuto. Non superare i dosaggi appropriati.

Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l.
via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Distribuito da: EMERALD s.r.l.

Tassi di applicazione: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Indicazioni per l'uso: Applicare 15-25 g/m² di prodotto su manto erboso in crescita. Applicare su manto asciutto. Irrigare dopo l'applicazione coprendo il manto erboso con 5 mm o 6 mm di acqua. Se la temperatura eccede i 25°C applicare solo dosaggi bassi ed irrigare immediatamente dopo l'applicazione. Applicare il prodotto a basse concentrazioni se la temperatura eccede i 25°C. Non usare su putting greens in campi da golf. Conservare in luogo asciutto e pulito. Risigillare il sacchetto aperto piegando ed assicurando la parte superiore. Usare solo spargitori puliti ed asciutti. Non lasciare prodotto non usato negli spargitori.

Sverige
EU GÖDSELMEDEL
NK gödselmedel med 96% långtidsverkande N
28–0–8
(28–3–10)

28,0% Kväve (N)
1,2% ammonium-N
26,8% urea-N
varav 26,8% från PCSCU

8,3% Kalium (K)
10,0% kaliumoxid (K_2O)

Baserat på ammoniumfosfat, urea, polymer- och svaveltäckt urea, liksom kaliumsulfat.

Bör endast användas av beprövade behov till golf-och fotbollsplaner, park och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB
c/o Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling NORGE

Rekomenderad mängd: 15 – 25 g/m² (150 – 250 kg/ha)

Gödsla när gräset är i tillväxt. Vattna 5-6 minuter efter påföring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25°C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. I samband med gödsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gödslet skal lagras tort.

Norge
NPK-gjødsel med 96% langsomtvirkende N
28 – 1 – 8
(28–3–10)

28,0% Nitrogen (N)
1,2% ammonium-N
26,8% urea-N
hvorav 26,8% fra PCSCU

1,3% Fosfor (P)
3,0% fosforpentoksyd (P_2O_5)

8,3% Kalium (K)
10,0% kaliumoksyd (K_2O)

5,9% Svovel (S)

Basert på ammoniumfosfat, urea, polymer- og svoveldekket urea, samt kaliumsulfat.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 Dilling NORGE

Reg. nr. (Mattilsynet): 4766

Anbefalte gjødselmengder: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Gjødsla tilføres når graset er i vekst. Det vannes 5-6 minutter etter at gjødsling er utført, for å få gjødselkornene ned i plantebestandet. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25°C), og vann øyeblikkelig for å unngå sviskader. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i sprederen. Gjødsla skal lagres tørt.

Denmark
EC KUNSTGØDNING
NK KUNSTGØDNING
28 + 0 + 8.3

28,0% Samlet kvælstof (N)
1,2% Ammoniumkvælstof (N)
26,8% Ureakvælstof (N)

8,3% Kalium (K) vandopløseligt

5,9% Svovl (S) vandopløseligt

Lavt kloridindhold. Bør kun bruges når det er konstateret, at der er behov for det. De passende dosisrater må ikke overskrides.

Importeres i Danmark af: Floratine Norge AS
Gullfunnet 50
1570 DILLING

Applikationsrater: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Brugsanvisninger: Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15-25 g/m². Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunstvanding. Hvis temperaturen er over 25°C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunstvande øjeblikkeligt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25°C. Må ikke kommes på putting greens. Opbevares et rent, tørt sted. Forsegl den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

België
EC-KUNSTMEST
NK-KUNSTMEST
28 + 0 + 10

28,0% totaal stikstof (N)
1,2% ammoniakstikstof (N)
26,8% ureumstikstof (N)

10,0% kaliumoxide (K_2O), in water oplosbaar

14,7% zwaveltrioxide (SO_3), in water oplosbaar

Laag chloridegehalte. Alleen gebruiken waar dit zichtbaar nodig is. Aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden.

Importeur voor België: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen – België

Aan te brengen hoeveelheden: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 15-25 g/m². Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (5 à 6 mm). Bij temperaturen > 25°C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Bij temperaturen > 25°C slechts in kleine hoeveelheden aanbrengen. Niet gebruiken op putting greens. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.

Belgique
ENGRAIS EC
ENGRAIS NK
28 + 0 + 10

28,0% Azote totale (N)
1,2% Azote ammoniacal (N)
26,8% Azote uréique (N)

10,0% Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau

14,7% Anhydride sulfurique (SO_3) soluble dans l'eau

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.

Importation en Belgique par: Sports Management bvba
Lorkenlaan 14
2950 Kapellen – Belgique

Taux d'application : 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m². Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31
28 + 3 + 10

28,00% Ολικό Άζωτο (N)
1,17% Αμμωνιακό Άζωτο
26,83% Άζωτο από Ουρία

3,00% Διαθέσιμα Φωσφορικά (P_2O_5)

10,00% Διαλυτό Κάλιο (K_2O)

5,89% Ολικό θείο (S)
2,49% Ελεύθερο Θείο(S)
3,40% Συνδυασμένο Θείο(S)

Περιέχει μόνο χαμηλή ποσότητα χλωριούχων αλάτων.
Να χρησιμοποιείτε μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τον κατάλληλο ρυθμό δόσης.

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Geoponikos Oikos
3 Makedonias St., Athens, GREECE

Ρυθμοί εφαρμογής: 15-25g/m² (150-250 kg/ha)

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m². Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Ποτίστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγρομένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε μόνο σε χαμηλούς ρυθμούς αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C. Μη χρησιμοποιείτε σε γκαζόν «putting green». Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλίζοντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)
28 + 3 + 10

28.0% Total Nitrogen (N)
1.17% Ammoniacal Nitrogen
26.83% Urea Nitrogen*

3.0% Available Phosphate (P_2O_5) from ammonium phosphate

10.0% Soluble Potash (K_2O) from potassium sulfate

5.89% Total Sulfur (S) from sulfur

*26.83% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Australia
28 + 1.3 + 8.3

28.0% Total Nitrogen (N)
1.2% Ammoniacal Nitrogen
26.8% Urea Nitrogen

1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

8.3% Potassium (K) from potassium chloride

5.9% Sulfur (S) from sulfate

*26.83% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand
28 + 1.3 + 8.3

28.0% Total Nitrogen (N)
1.2% Ammoniacal Nitrogen
26.8% Urea Nitrogen

1.3% Phosphorus (P) from ammonium phosphate

8.3% Potassium (K) from potassium chloride

5.9% Sulfur (S) from sulfate

*26.83% Slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea.

Application rates: 15-25 g/m² (150-250 kg/ha)

Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m². Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Spreaders	Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
			15 g/m²	20 g/m²	25 g/m²	
Model 2000 & 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = **FULL RATE**	5 km/hr	3.6 m	K 1/2	L 1/2	M 1/2	
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-A) Settings for single pass application = **FULL RATE**	7 km/hr	9.7 m	5 1/2	6	6 1/2	
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = **FULL RATE**	7 km/hr	9.1 m	30	33	36	

Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.

The Andersons®

Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
www.andersonsplantnutrient.com

25 kg/net
APPG28265

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; PolySports and NS-54 are trademarks of The Andersons, Inc.

A17