

# Tee Time<sup>®</sup>

## SGN 100

# 13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu

## (13 + 0.9 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu)

USA/INT	13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total Nitrogen (N)
13.0%	Ammoniacal Nitrogen
2.0%	Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) from ammonium phosphate
13.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
18.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

### Application rates: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

UK/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N)
13.0%	Ammoniacal nitrogen (N)
13.0%	Potassium oxide (K <sub>2</sub> O) water soluble
46.0%	Sulphur trioxide (SO <sub>3</sub> ) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate  
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

### Application Rates: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Eire/EC	EC FERTILISER NK FERTILISER CONTAINING Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N)
13.0%	Ammoniacal nitrogen (N)
10.8%	Potassium (K) water soluble
18.4%	Sulphur (S) water soluble
0.1%	Copper (Cu)
2.0%	Iron (Fe)
0.1%	Manganese (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd.  
Block 5 Unit 1 - Banded Industrial Estate  
Throsk, Stirling - Scotland FK7 7NP

### Application rates: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Deutschland/Österreich	EC-DÜNGER NK-DÜNGER MIT EISEN, MANGAN, ZINK UND KUPFER 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0 %	N Gesamtstickstoff 13,0% N Ammoniumstickstoff
13,0 %	K <sub>2</sub> O wasserlösliches Kaliumoxid
18,4 %	S Schwefel
0,1 %	Cu Kupfer
2,0 %	Fe Eisen
0,1 %	Mn Mangan
0,1 %	Zn Zink

Nettogewicht: 20kg

Hersteller:  
Turf Handels GmbH, Am Harlboden 48, A-8101 Gratkorn

### Aufwandmenge: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Anwendungsempfehlung:** Das Produkt mit einer Streueinstellung von 15-25 g/m<sup>2</sup> auf einem aktiv wachsenden, trockenem Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Dieses Produkt enthält Eisen, das Flecken auf Zement und anderen Oberflächen hinterlassen kann. Restpartikel sofort durch Wegfegen oder -bläsen entfernen, um Fleckenbildung zu verhindern. NICHT MIT WASSER ABWASCHEN. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sicher verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

España/CE	ABONO CE NK abono que contenga Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	Nitrógeno total (N)
13,0%	Nitrógeno amoniacal (N)
13,0%	de óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua
46,0%	de azufre (SO <sub>3</sub> ) soluble en agua
0,1%	Cobre (Cu)
2,0%	Hierro (Fe)
0,1%	Manganeso (Mn)
0,1%	Zinc (Zn)

Bajo en cloruro. Para ser utilizado sólo cuando hay una necesidad reconocida. No sobrepasar las dosis recomendadas.

Importador para España:

### Dosis de aplicación: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 Kg/ha)

**Instrucciones de uso:** Aplicación de productos en crecimiento activo del césped. Aplicar cuando la hoja está seca. Regar después de la aplicación con 5 a 6 mm de agua de riego. Se aconseja aplicar sólo a dosis bajas si las temperatura es superior a 25°C. Regar inmediatamente después de la aplicación. Este producto contiene hierro que puede manchar zonas aplicadas a otras superficies. Eliminar las partículas sobrantes barriendo o soplando (máquinas sopladoras) para evitar manchas. NO SE LAVIA CON AGUA. Conservar el envase en un lugar limpio y seco. Una vez abierto el saco evitar que entre humedad, asegúrese de cerrar la parte superior del saco. Utilice sólo abonadoras limpias y secas. No deje de producto no utilizado en las abonadoras.

Norge	NPK-gjødsel med mikronæring 13 – 1 – 11 (13 – 2 – 13)
13,0%	Nitrogen (N) 13,0% ammonium-N
0,9%	Fosfor (P) 2,0% fosforpentoksyd (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
10,8%	Kalium (K) 13,0% kaliumoksyd (K <sub>2</sub> O)
18,4%	Svovel (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Sink (Zn)
0,1%	Mangan (Mn)

Baseret på ammoniumfosfat, ammonium- og kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan- og sinkoksyd, samt jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat.

Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.

Distributør i Norge: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 Dilling, NORGE

Reg. nr. (Mattilysynet): 3270

### Anbefalte gjødselmengder: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

Gjødsla tilføres når graset er i vekst. Det vannes 4-5 minutter etter at gjødsling er utført, for å løse opp gjødselkornene. Bruk mindre gjødselmengder ved høge temperaturer (> 25 °C), og varn øyeblikkelig for å unngå sviskader. Dette produktet inneholder jern som kan mislange betong og andre overflater. Fjern partikler omgående ved feiling eller blåsning. VASK IKKE BORT MED VANN. I forbindelse med gjødsling skal det kun benyttes tørre og reine gjødselspredere. La ikke gjødsel bli liggende igjen i spredere. Gjødsel skal lagres tørt.

Denmark	NPK-kunstgødning med mikronæringsstoffer 13–1–11 (13–2–13)
13,0%	Kvælstof (N) 13,0% ammonium-N
0,9%	Phosphor (P) 2,0% fosforpentoxid (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
10,8%	Kalium (K) 13,0% kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)
18,4%	Svovl (S)
2,0%	Jern (Fe)
0,1%	Kobber (Cu)
0,1%	Zink (Zn)
0,1%	Mangan (Mn)

Baseret på ammoniumfosfat, ammonium- og kaliumsulfat, jern, kobber, mangan og zinkoxid samt jern-, kobber-, mangan- og zinksulfat.

Må kun bruges til dokumenterede behov for golf- og fodboldbaner, parker og haver. De anbefalede mængder må ikke overskrides.

Distributør i Danmark: Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 DILLING, NORGE

### Applikationsrater: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Bruksanvisninger:** Kom produktet på aktivt voksende grønsvær ved 15–25 g/m<sup>2</sup>. Kom det på tørre græsstrå. Vand efter påføringen med 5 to 6 mm kunsvandning. Hvis temperaturen er over 25 °C eller hvis man ikke kan undgå at komme det på fugtig eller våd grønsvær, skal man kunsvande øjeblikkegt efter påføringen. Kom det på langsomt hvis temperaturen er over 25 °C. Dette produkt indeholder jern, som kan plette beton og andre overflader. Fjern partikler med det samme ved at feje eller blæser for at undgå pletter. MÅ IKKE VASKES AF MED VAND. Opbevares et rent, tørt sted. Forsøg den åbne pose igen ved at folde toppen ned og fastgøre den. Brug kun rene, tørre spredere. Der må ikke efterlades ubrugt produkt i en spreder.

Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31	13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13,0%	Ολικό άζωτο (N) 13,0% Αμμωνιακό άζωτο
2,0%	Διαθέσιμα Φωσφορικά (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )
13,0%	Διαλυτό Κάλιο (K <sub>2</sub> O) από θειικό κάλιο
18,4%	Ολικό θείο (S)
0,1%	Ολικός Χαλκός (Cu) από οξειδίο του χαλκού
2,0%	Σίδηρος (Fe) από οξειδίο σιδήρου
0,1%	Μαγγάνιο (Mn) από οξειδίο μαγγανίου
0,1%	Ψευδάργυρος (Zn) από οξειδίο ψευδαργύρου

Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georpanikos Oikos  
3 Makedonias St., Athens, GREECE

### Ρυθμοί εφαρμογής 15–30 g/m<sup>2</sup> (150–300 kg/ha)

**Οδηγίες χρήσης:** Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-30 g/m<sup>2</sup>. Εφαρμόστε σε ζήλη φυλλωσιά. Μερό μετά από εφαρμογή με άρδευση 5 έως 6 mm. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνει την εφαρμογή σε υπαίθριο ή υπό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25°C. Το προϊόν αυτό περιέχει σίδηρο που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε ταπέτο και άλλες επιφάνειες. Καθαρίστε τα σκαμπίδια αμέσως με σκούπισμα ή ψύγμα για να αποφεύγετε το λέκισμα. ΜΗΝ ΞΕΠΛΑΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να γάνυ στραγιζέτε τις ανοιχτές σκούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς το. Να χρησιμποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.

Taiwan (R.O.C.)	13 + 2 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total Nitrogen (N)
13.0%	Ammoniacal Nitrogen
2.0%	Available Phosphate (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) from ammonium phosphate
13.0%	Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) from potassium sulfate
18.4%	Total Sulfur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

### Application rates: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

Australia	13 + 0.9 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N)
13.0%	Ammoniacal nitrogen (N)
0.9%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
10.8%	Potassium (K) from potassium sulfate
18.4%	Sulphur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

### Application rates: 1.5–2.5 kg/100 m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 1.5–2.5 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

New Zealand	13 + 0.9 + 10.8 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Total nitrogen (N)
13.0%	Ammoniacal nitrogen (N)
0.9%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate
10.8%	Potassium (K) from potassium sulfate
18.4%	Sulphur (S) from sulfate
0.1%	Copper (Cu) from copper oxide
2.0%	Iron (Fe) from iron oxide
0.1%	Manganese (Mn) from manganese oxide
0.1%	Zinc (Zn) from zinc oxide

### Application rates: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Directions for use:** Apply product to actively growing turf at 15–25 g/m<sup>2</sup>. Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. This product contains iron which may stain concrete and other surfaces. Remove particles promptly by sweeping or blowing to avoid staining. DO NOT WASH OFF WITH WATER. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.

France/EC	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Azote totale (N)
13.0%	Azote ammoniacal (N)
13.0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
46.0%	Anhydride sulfurique (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau
0.1%	Cuivre (Cu)
2.0%	Fer (Fe)
0.1%	Manganèse (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)

Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en France par: LOB GREEN S.A.S.  
25 Rue de la Chapelle  
GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France

### Taux d'application : 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25 °C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Eliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

Sverige	EU GÖDSELMEDEL NK-gödselmedel med mikronäring 13 – 0 – 11 (13 – 2 – 13)
13,0 %	Kväve (N) 13,0% ammonium-N
10,8 %	Kalium (K) 13,0% kaliumoxid (K <sub>2</sub> O)
18,4 %	Svavel (S)
2,0 %	Järn (Fe)
0,1 %	Koppar (Cu)
0,1 %	Zink (Zn)
0,1 %	Mangan (Mn)

Baseret på ammoniumfosfat, ammonium- og kaliumsulfat, järn-, koppar-, mangan- och zinkoxid, samt järn-, koppar-, mangan- och zinksulfat.

Bör endast användas vid behov till golf- och fotbollplaner, park- och trädgårdsområden. De rekommenderade mängderna får inte överskridas.

Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB  
c/o Floratine Norge AS  
Gullfunnet 50  
1570 Dilling, NORGE

### Rekommenderad mängd: 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

Gjødsla når graset å i tillväxt. Vattna 4-5 minuter efter påføring, för att lösa upp gödselkornen. Använd mindre gödselmängder vid höga temperaturer (> 25 °C), och vattna omedelbart för att undvika brännskador. Denna produkt innehåller järn som kan missfärga betong och andra ytor. Ta bort partiklar snabbt genom sponing eller blåsning. TVÄTTA INTE BORT MED VATTEN. I samband med gjødsling bör endast torra och rena gödselspridare användas. Låt inte gödselmedel bli liggande kvar i spridaren. Gødslet skal lagras tørt.



Belgique	ENGRAIS EC ENGRAIS NK AVEC Fe, Mn, Zn, Cu 13 + 0 + 13 + Fe, Mn, Zn, Cu
13.0%	Azote totale (N)
13.0%	Azote ammoniacal (N)
13.0%	Oxyde de potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau
46.0%	Anhydride sulfurique (SO <sub>3</sub> ) soluble dans l'eau
0.1%	Cuivre (Cu)
2.0%	Fer (Fe)
0.1%	Manganèse (Mn)
0.1%	Zinc (Zn)


Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les débits de dose appropriés.

Importé en Belgique par: Sports Management bvba  
Lorkenlaan 14  
2950 Kapellen – Belgique

### Taux d'application : 15–25 g/m<sup>2</sup> (150–250 kg/ha)

**Mode d'emploi :** Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15–25 g/m<sup>2</sup>. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25 °C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25 °C. Ce produit contient du fer, susceptible de tacher le béton et d'autres surfaces. Eliminer rapidement les particules en balayant ou en soufflant pour éviter toute tache. NE PAS LAVER À L'EAU. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épanduses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épanduses.

 <b>Spreaders</b> 	<b>Ground Speed</b>	<b>Width of Coverage</b>	<b>Spreader Settings</b>			
			<b>15 g/m<sup>2</sup></b>	<b>20 g/m<sup>2</sup></b>	<b>25 g/m<sup>2</sup></b>	
<b>Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	3.0 m	J	K	L 1/4	
<b>SSD Drop Spreader</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b>	5 km/hr	0.9 m	3 3/4	4 1/4	4 3/4	
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.						



Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P.O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
[www.andersonspanutrient.com](http://www.andersonspanutrient.com)

The Andersons logo and Tee Time are registered trademarks of The Andersons, Inc.

# 20 kg/net

# APPG13M4

K17